

Vorbereitung zur Darmspiegelung am Nachmittag mit Moviprep

Wichtig:

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen genau, damit eine problemlose Untersuchung möglich ist.

Während 4 Tagen vor der Untersuchung:

4 Tage vor der Untersuchung sollten Sie alle Speisen mit kleinen Kernen meiden, z.B. Trauben, Tomaten, Feigen, Leinsamen, Vollkornbrot, Müesli, Früchte mit kleinen Kernen (wie Kiwi), Beeren usw.

Am Tag vor der Untersuchung:

Sie dürfen am Vortag bis und mit Nachtessen Nahrung zu sich nehmen, jedoch nur noch leicht verdauliche Kost: Weissbrot, Zwieback, Butter, Margarine, Honig, Joghurt ohne Früchte, Käse, Eier, Fisch, Fleisch, Teigwaren, Kartoffeln ohne Schale, Polenta, weisser Reis. Nahrungsmittel mit Schalen (Tomaten, Peperoni, Pilze, Trauben usw.) sind nicht mehr erlaubt. **Trinken Sie viel auch nach dem Nachtessen.**

Am Untersuchungstag:

Am Morgen dürfen Sie nicht mehr essen jedoch noch **klare Flüssigkeiten** trinken: Wasser, Süssgetränke (ohne Fruchtfleisch), Tee, Kaffee (ohne Milch), Bouillon

Um 06:00 Uhr nehmen Sie bitte den **1. Liter** von Moviprep® ein.

Die Zubereitung von MOVIPREP® ist leicht



1 Beutel A + 1 Beutel B
auf 1 Liter Wasser



Gut verrühren
Vorschlag: Kühlen



Den 1. Liter MOVIPREP®-Lösung innerhalb
von 1 bis 2 Stunden einnehmen



Den 2. Liter auf die
selbe Weise zubereiten*

Mischen Sie den Inhalt eines Beutels A und eines Beutels B mit 1 Liter Wasser und rühren Sie bis sich das Pulver vollständig auflöst (kann 10 Minuten dauern).

Trinken Sie die Lösung (wenn möglich vorab für 5-10 Minuten in den Kühlschrank stellen) innerhalb von 1-2 Stunden.

Trinken Sie bitte mindestens 1 Liter frei wählbare klare Flüssigkeit dazu.

Um 09:00 Uhr nehmen Sie den **2. Liter** von Moviprep® ein.

Mischen Sie den Inhalt eines Beutels A und eines Beutels B mit 1 Liter Wasser und rühren Sie bis sich das Pulver vollständig auflöst (kann 10 Minuten dauern).

Trinken Sie die Lösung (wenn möglich wieder vorab für 5-10 Minuten in den Kühlschrank stellen) innerhalb von 1-2 Stunden.

Trinken Sie bitte mindestens 1 Liter frei wählbare klare Flüssigkeiten dazu, bis sich nur noch gelblich-klares Flüssigkeit entleert. Sie dürfen bis eine Stunde vor der Untersuchung trinken.

Bei Fragen oder Unklarheiten nehmen Sie bitte frühzeitig mit uns Rücksprache.